



Государственный комитет  
Совета Министров СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

## К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 594960

- (61) Дополнительное к авт. свид-ву —  
(22) Заявлено 15.06.76 (21) 2374758/28-13  
с присоединением заявки № —  
(23) Приоритет —  
(43) Опубликовано 28.02. 78. Бюллетень № 8  
(45) Дата опубликования описания 23.03.78

(51) М. Кл.<sup>2</sup> А 61В 1/00  
А 61М 29/00

(53) УДК 616.07(088.8)

(72) Авторы  
изобретения Н. М. Побединский, А. И. Волобуев, Н. К. Москвитина и В. Н. Дудин

(71) Заявитель Всесоюзный научно-исследовательский институт акушерства  
и гинекологии

### (54) ПРИБОР ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СРАЩЕНИЙ

1

Изобретение относится к области медицины, в частности к гинекологии — к способам лечения невынашивания беременности и бесплодия.

В настоящее время для разрушения внутриматочных сращений применяют хирургические операции, производимые вслепую, бесконтрольно, влагалищным путем, суть которых состоит в расширении цервикального канала и разрушении синехий кюреткой [1].

Целью изобретения является увеличение эффективности, снижение травматичности, повышение результативности лечения и обеспечение визуального контроля.

Для этого предлагается применять гистероскоп с латексным баллончиком, используемый ранее для исследования полости матки, т. е. для диагностики внутриматочной патологии [2], в качестве прибора для разрушения внутриматочных сращений.

Сущность изобретения состоит в том, что в начале лечения больным применяют в течение 2-х менструальных циклов грязелечение — «грязевые трусы» (10—15 процедур) с ежедневным чередованием ультразвука (15 процедур) в импульсном режиме. Во второй фазе цикла 2-го месяца в толщу шейки матки вводят, например, лидазу по 128 ед., т. е. 2 фармакологические дозы по 3—5 мл в 0,25%-ном растворе новокаина. Количество инъекций 7—10. На-

2

кануне менструации с диагностической и лечебной целью проводят гистероскопию. В полость матки вводят гистероскоп, заполняют латексный баллончик раствором, который нагнетают шприцем, баллон давит на стенки матки, увеличивая тем самым ее объем до разрыва сращений. Под контролем зрения видно, как постепенно растягиваются и разрушаются внутриматочные сращения. Растягивать баллончик надо медленно, постепенно, периодически уменьшая и увеличивая объем раствора, вводимого в него.

После разделения внутриматочных сращений в целях предотвращения их образования вновь в полость матки вводят полиэтиленовую внутриматочную спираль № 2—3. После разделения синехий на протяжении одного менструального цикла проводят циклическую гормональную терапию (микрофоллин по 0,05 мг с 1-го по 18-й день цикла и с 19-го по 27-й день цикла прегнин по 0,01 мг 3 раза в день) и витаминотерапию, что улучшает функцию яичников и регенерацию эндометрия.

Внутриматочную спираль извлекают спустя два месяца. В целях контроля лечения через 4—5 месяцев после разделения внутриматочных сращений производят гистеросальпингографию.

Лечение было проведено у 25-ти женщин с массивными внутриматочными сращениями.